

RallyTM EC

FUNGICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Myclobutanil.....240 g/L
Alfa-butil-alfa-(4-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-1-propanonitrilo, de formulación a 20°C.

INGREDIENTES ADITIVOS.....c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. 1383

Titular del Registro: Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.

FORMULADO POR:

Corteva Agriscience Italy S.R.L.
Mozzanica Plant
Strada Statale 11 Km 190,2
24050 Mozzanica (BG) - Italia

DISTRIBUIDO POR:

Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401
Bogotá, Colombia
Tel: (601) 259 5900

TM ® Marcas registradas de Corteva Agriscience
y de sus compañías afiliadas. © Corteva.



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

Rally™ EC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.

Rally™ EC es un fungicida sistémico con propiedades protectoras y curativas contra una amplia gama de hongos.

Rally™ EC se absorbe rápidamente en las hojas, protege las hojas nuevas y controla al hongo hasta 4 días después de haberse iniciado la infección. Tiene un efecto residual de 14 a 21 días.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.	P.R.
ARROZ	Pudrición de la vaina <i>Sarocladium oryzae</i>	100 mL/ha*	15 días	4 horas
CEBOLLA	Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i> L.	200 mL/ha**	3 días	4 horas
FRÍJOL	Antracnosis <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	200 mL/ha**	1 día	4 horas

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de re-entrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas al área tratada.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de mezcla hasta $\frac{1}{4}$ con agua, adicione la dosis total del Rally™ EC, agite bien y agregue agua hasta llenar el tanque. En caso de mezclas con otros fungicidas o insecticidas se deben hacer pruebas previas de compatibilidad.

Para mejorar la cobertura de la aplicación se recomienda el uso de Kaytar™ ACT SL al 0.25% v/v u otro coadyuvante no iónico.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En arroz realizar 2 aplicaciones. Aplicar al inicio de primordio floral (45-50 días después de germinado el cultivo). Debido a la dinámica del patógeno, se recomienda repetir la aplicación en pleno embuchamiento (cerca de los 70-75 días después de germinado el cultivo).

En cebolla y frijol use una vez por ciclo de cultivo con un volumen de agua de 400 L.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No se han registrado daños a los cultivos cuando se usan las dosis recomendadas. Si se van a realizar mezclas, se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en áreas pequeñas. No es compatible con productos que contengan cal.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Rally[™] EC

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).
- CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.
- CAUSA IRRITACIÓN A LA PIEL.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

“Utilice ropa protectora durante la manipulación y la aplicación”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.

En caso de contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.

En caso de ingestión: Inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inhalación: Lleve a la persona al aire libre. Consulte a un médico si es necesario.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (601) 2886012 - 9191919

ALMACENAMIENTO

No almacenar en casas de habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Manténgalo alejado del calor y las chispas.

Almacenar en un lugar seco.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Altamente tóxico para organismos acuáticos.

Altamente tóxico para abejas.

No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.

No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.

Evite contaminar con **Rally[™] EC** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. “Los aplicadores del producto formulado, están obligados a respetar las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 04/04/2022

